

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -3-6-71 188041

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "MIDI-PYRENEES"

(ARIÈGE, AVEYRON, HAUTE-GARONNE, GERS, LOT,
HAUTES-PYRENEES, TARN, TARN-ET-GARONNE)

(Tél. 86-31-55 et 86-32-55)

PROTECTION DES VEGETAUX - Rue St-Jean prolongée
B. P. n° 20 — 31 - BALMA

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

S/Rég. recettes Dir. Dép. Agri. Hte-Gne
Rue St-Jean prolongée - BALMA
C. C. P. 8612-11 TOULOUSE

- Supplément N° 3 au Bulletin N° 128 de Mai 1971 -

1971 - 16ème envoi

ARBRES A FRUITS A PEPINS

-Carpocapse des pommes et des poires :

Les premières pénétrations de quelque importance vont avoir lieu dans les prochains jours. En conséquence, dans les vergers particulièrement sensibles aux attaques de cet insecte, un traitement devrait être appliqué dès à présent.

Dans les plantations situées à plus de 400 mètres d'altitude, il est encore trop tôt pour intervenir ; attendre un prochain bulletin.

Employer l'un des produits énumérés dans l'édition spéciale de Mars 1971, en donnant la préférence à une spécialité à base d'arséniate de plomb, en particulier dans les vergers envahis par les araignées rouges.

-Tavelures du pommier et du poirier :

Seulement dans les vergers où des taches existent, poursuivre la protection dès que les pluies seront à craindre.

ARBRES A FRUITS A NOYAU

-Carpocapse des prunes :

Le premier vol de papillons est terminé. Il sera inutile d'intervenir jusqu'à ce que la Station donne de nouvelles indications à son sujet.

-Tordeuse orientale du pêcher :

Dans les pépinières et les vergers en formation, si cela n'a pas été fait récemment, un traitement avec un produit à base de mévinphos pourrait être appliqué dès maintenant.

-Anthracnose du cerisier :

Nous rappelons les termes du précédent bulletin du 26 mai.

VIGNE

-Mildiou :

La longue période pluvieuse du 13 au 28 mai a permis au champignon de se reproduire autour et à partir des foyers primaires initiaux. Depuis quelque temps, de nouvelles taches apparaissent presque chaque jour, néanmoins, la situation d'ensemble reste bonne, la maladie n'étant pas encore généralisée à toutes les vignes, la plupart étant encore totalement indemnes.

Dans les vignes où des taches sont observées, effectuer un nouveau traitement dès la première menace de pluie.

-Botrytis (pourriture grise) :

Depuis quelque temps, on constate fréquemment la présence de larges taches brunes sur les feuilles, souvent au niveau d'une nervure principale. Parfois mais rarement des grappes sont atteintes. Il s'agit là d'une forme d'attaque de Botrytis due à des pluies violentes plus ou moins accompagnées de petits grêlons. Il y a lieu de ne pas confondre ces altérations avec des taches de Mildiou qui commencent toujours

P.1.9.53

par une décoloration des tissus. Il n'est pas nécessaire de faire un traitement spécifique.

-Vers de la grappe :

Le mauvais temps a dû contrarier l'application du traitement recommandé dans les vignes très sensibles (bulletin du 18 mai). Il est encore possible d'effectuer un traitement valable à la condition d'intervenir sans attendre par un traitement curatif. Nous rappelons qu'en première génération une intervention n'est nécessaire que s'il y a plus d'une chenille par grappe de moyenne.

CULTURES LEGUMIERES

-Melon : (Cladosporiose - Anthracnose)

Si le beau temps se maintient, il est inutile d'effectuer un nouveau traitement fongicide.

Les premiers foyers de pucerons étant susceptibles d'apparaître prochainement, surveiller les cultures et, le cas échéant, traiter ces foyers avec un produit autorisé en culture légumière.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles,

J. BESSON - E. JOLY

BALMA, le 2 Juin 1971
Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"Midi-Pyrénées"

L. IMBERT

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles de "MIDI-PYRENEES".

Le Directeur-Gérant : L. BOUYX.